



## PREPARACIÓ PER TAC ABDOMINAL AMB CONTRAST

1. Haurà de venir al centre amb **dejú de 6 hores**.
2. **Portar l'última analítica (NO MÉS DE 6 MESOS)** realitzada on consti funció renal: creatinina- urea- albúmina (Filtrat Renal)
3. **Venir 20 minuts abans** de l'hora programada per beure el contrast oral.
4. Els **pacients al·lèrgics al iode**, marisc o a algun altre tipus de fàrmac haurà d'avisar al personal abans de l'exploració.
5. Els **pacients diabètics que prenguin METFORMINA\*** hauran de suspendre el tractament 48 hores abans de la cita i no tornar-lo a prendre fins a 48 hores després (consulta el teu metge).

\* Fàrmacs relacionats amb la METFORMINA

## PREPARACIÓ PER TAC AMB CONTRAST (RENAL, TÒRAX, CRANIAL O ALTRES)

1. Haurà de venir al centre amb **dejú de 6 hores**.
2. **Portar l'última analítica (NO MÉS DE 6 MESOS)** realitzada on consti funció renal: creatinina- urea- albúmina (Filtrat Renal)
3. Els **pacients al·lèrgics al iode**, marisc o a algun altre tipus de fàrmac haurà d'avisar al personal abans de l'exploració.
4. Els **pacients diabètics que prenguin METFORMINA\*** hauran de suspendre el tractament 48 hores abans de la cita i no tornar-lo a prendre fins a 48 hores després (consulta el teu metge).

\* Fàrmacs relacionats amb la METFORMINA

- [AMARYL](#) ®
- [DAONIL](#) ®
- [EFFICIB](#) ®
- [JENTADUETO](#) ®
- [LYXUMIA](#) ®
- [METFORMINA RATIOPHARM](#) ®
- [PRANDIN](#) ®
- [TESAVEL](#) ®
- [TRAJENTA](#) ®