



## PREPARACIÓN PARA TAC ABDOMINAL CON CONTRASTE

1. Deberá venir al centro con **ayuno de 6 horas**.
2. Llevar **la última analítica** (NO MÁS DE 6 MESES) realizada donde conste función renal: creatinina- urea- albúmina (Filtrado Renal)
3. **Venir 20 minutos antes** de la hora programada para beber el contraste oral.
4. **Los pacientes alérgicos al yodo**, mariscos o en algún otro tipo de fármaco deberá avisar al personal antes de la exploración.
5. **Los pacientes diabéticos que tomen METFORMINA** \* deberán suspender el tratamiento 48 horas antes de la cita y no volver a tomar hasta 48 horas después (consulta a tu médico).

\* Fármacos relacionados con la METFORMINA

## PREPARACIÓN PARA TAC CON CONTRASTE (RENAL, TÓRAX, CRANEAL, OTROS)

1. Deberá venir al centro con **ayuno de 6 horas**.
2. Llevar **la última analítica** (NO MÁS DE 6 MESES) realizada donde conste función renal: creatinina- urea- albúmina (Filtrado Renal)
3. **Los pacientes alérgicos al yodo**, mariscos o en algún otro tipo de fármaco deberá avisar al personal antes de la exploración.
4. **Los pacientes diabéticos que tomen METFORMINA** \* deberán suspender el tratamiento 48 horas antes de la cita y no volver a tomar hasta 48 horas después (consulta a tu médico).

\* Fármacos relacionados con la METFORMINA

- [AMARYL](#) ®
- [DAONIL](#) ®
- [EFFICIB](#) ®
- [JENTADUETO](#) ®
- [LYXUMIA](#) ®
- [METFORMINA RATIOPHARM](#) ®
- [PRANDIN](#) ®
- [TESAVEL](#) ®
- [TRAJENTA](#) ®